



LA EOSINOFILIA
COMO COMPONENTE DE LA FORMULA LEUCOCITARIA
DE LA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA EPIDEMICA

— **Dr. Américo Negrette.**
Lab. Cl. C. L. Rollins.
Lab. Cl. Gabriel Sulbarán S.




En oportunidad de estudiar una epidemia de mononucleosis infecciosa, nos llamó poderosamente la atención el hecho de que eran muy notorias las manifestaciones aparentemente alérgicas. Pacientes a quienes nosotros habíamos recetado antibióticos (tetraciclina), recibían la recomendación de otros colegas, de suspenderlos inmediatamente. Siempre confundieron el rash propio de la enfermedad, con fenómenos alérgicos banales medicamentosos.

Nos interesó también la fenomenología neurovegetativa (con predominio ocasional vagal o simpático) en el período de estado, y la marcada astenia, ya clásica, en la convalecencia. Nos preguntamos: hay tendencia a lesionar las glándulas suprarrenales en esta enfermedad?. Por allí llegamos al camino de la fórmula leucocitaria y la numeración de eosinófilos. En nuestro medio, eosinofilia, para la mayoría, es señal de parasitosis. Las manifestaciones de caris netamente alérgico que observamos en nuestros pacientes, nos hicieron pensar que la eosinofilia dependía de la propia enfermedad. Revisamos un poco de bibliografía, pero no encontramos referencias a esta eosinofilia de la mononucleosis infecciosa. Por eso decimos que la eosinofilia y las manifestaciones pseudoalérgicas de esta enfermedad, no deben ser imputadas a otras causas. Pensamos que la eosinofilia debe ser tomada en cuenta como componente de la imagen propia de la mononucleosis infecciosa epidémica.



De cuarenta y dos pacientes estudiados desde este punto de vista, catorce (33%) estuvieron dentro de los límites normales; **veintiocho (66%) presentaron eosinofilia**. Doce pacientes (28%) presentaron más del doble de la cifra máxima normal de eosinófilos, y cuatro presentaron 12 eosinófilos. Las cifras más altas halladas fueron respectivamente 19 eosinófilos en un niño de nueve años de edad, y 27 eosinófilos en un adulto de treinta y siete años (a este señor, dos días después de esta eosinofilia se le practicó una reacción de Paul Bunnell y dio una aglutinación de 256. Un mes antes su aglutinación había sido 32).



CONCLUSION

— En la mononucleosis infecciosa epidémica hay eosinofilia.